

Volg je eigen Ringmus met kleurringen.

Bij Eastermar broeden elk jaar wel zo'n 40 à 50 paartjes **Ringmussen**. Een mussensoort die eigenlijk niet onder de dakpannen broedt. Maar vooral nesten maakt in de nestkasten van o.a. de Vogelwacht; in het bijzonder rondom het dorp. In Nederland doen de vogels het niet goed. Ze gaan achteruit. Maar dat is niet het geval bij ons dorp. Daarom wordt sinds dit voorjaar door de Ringgroep van de Vogelwacht Eastermar onderzoek gedaan aan deze vogelsoort. Als project samen met het Vogeltrekstation (onderdeel van de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen) in Wageningen.

U kunt daarbij helpen. Het is een mooie gelegenheid om je eigen vogel te volgen. De Ringgroep heeft jonge en oude Ringmussen met kleurringen geringd. Zo kan **elke Ringmus** herkend worden en kunt u de vogel ook een naam geven en wellicht lang volgen. Vooral straks al ze op uw voedertafel komen om te eten. Op de bijgevoegde foto ziet u hoe een geringde vogel eruit ziet. Deze heeft 3 kleurringen maar anderen hebben er soms ook minder. Het is belangrijk om de combinatie van ringen op te schrijven en door te geven aan één van de volgende adressen: Germ de Vries (germdevries@planet.nl) tel.: 0512 - 471933 of Arend Timmerman (a.timmerman@zonnet.nl) tel.: 0512 - 472015.

Het noteren van de plaats van de ringen gaat net als volgt: linkerpoot = linkerbeen, rechterpoot is rechterbeen. Dus op de foto is de vogel geringd met de combinatie: **linkerpoot:** metaal ring , erboven gele ring; **rechterpoot** wit onder, rood boven.



De Ringgroep Eastermar wil bij dit project zoveel mogelijk dorpsbewoners en kinderen betrekken. Daarom zal de Vogelwacht elke inwoner apart benaderen met informatie. Het is ook de bedoeling dat het project bekend wordt bij de scholen in het dorp. De Ringgroep ontwikkelt daarvoor nog informatie die na de zomervakantie zal worden aangeboden aan de scholen.

Ringmussen zijn het beste te herkennen aan hun chocolade bruine kopveren waaronder een duidelijk zichtbare witte ring aanwezig is. De vogels zijn wat kleiner dan onze Huismussen. Ze lijken er wel wat op maar zijn veel schuwer. Toch komen ze, vooral na de broedtijd, heel graag op de voedertafels.